

### ARTIKEL PENELITIAN

- PERBANDINGAN MOCAF DENGAN TEPUNG KACANG MERAH DALAM PEMBUATAN BROWNIES KUKUS *GLUTEN FREE CASEIN FREE (GFCF)*
- PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*) TERHADAP KARAKTERISTIK YOGHURT CAMPURAN SUSU SAPI DAN KACANG MERAH (*Phaseolus vulgaris*)
- PENGARUH SUHU PENCELUPAN TERHADAP KARAKTERISTIK MINUMAN TEH HERBAL KULIT BUAH NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*)
- PENGARUH KONSENTRASI ETANOL TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG ILALANG (*Imperata cylindrica* (L) Beauv.) PADA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK
- PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN KARAKTERISTIK SENSORIS TEH *WHITE PEONY*
- PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG SUWEG (*Amorphophallus campanulatus*) DAN TEPUNG KACANG HIJAU (*Vigna radiate*) TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES
- PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG HANJELI (*Coix lacryma-Jobi*, L) DENGAN BUAH SALAK KERING (*Salacca edulis Reinw.*) TERHADAP KARAKTERISTIK SNACK BAR
- PENGARUH PERBANDINGAN KENTANG KUKUS DAN TEPUNG KACANG HIJAU (*Phaseolus radiatus* L.) TERHADAP KARAKTERISTIK FLAKES
- STUDI CEMARAN MIKROBA PADA RENDANG SAPI DI RUMAH MAKAN PADANG DI KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI
- PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TEH HERBAL KULIT KAKAO (*Theobroma cacao* L.)
- PENGARUH WAKTU EKSTRAKSI DAN KONSENTRASI ETANOL MENGGUNAKAN METODE *MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION (MAE)* TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RAMBUT JAGUNG (*Zea mays* L.)
- PENGARUH PERBANDINGAN SEMOLINA DAN TEPUNG BERAS HITAM TERHADAP KARAKTERISTIK PASTA *FETTUCCINE* BASAH



Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan  
Fakultas Teknologi Pertanian  
Universitas Udayana

# itepa

## Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan

**Vol 8 No. 1 Tahun 2019**

### SUSUNAN PENGURUS JURNAL ILMU dan TEKNOLOGI PANGAN

**Penanggung Jawab**  
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian

**Penasehat**  
Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana  
Koordinator Program Studi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan

**Pemimpin Redaksi**  
Ir. I Gusti Ayu Ekawati, MS.

**Anggota Redaksi**  
Luh Ari Yusasrini, S.TP., M.Si

**Penyunting Ahli (Mitra Bestari)**  
Prof. Dr. Ir. I Ketut Suter, MS. (Univ. Udayana)  
Prof. Dr. Ir. I Made Sugihita, M.Sc. (Univ. Udayana)  
Dr. Ir. I Nengah Kencana Putra, MS. (Univ.Udayana)  
Dr. Ir. Dewa Gede Mayun Permana, MS. (Univ.Udayana)  
Dr. Ir. Ni Made Yusa, MSi. (Univ.Udayana)  
Dr Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr.Sc (Univ.Udayana)  
Dr. Ni Wayan Wisaniyasa, S.TP., MP (Univ.Udayana)  
I Putu Supartha, S.P., M.Agr., Ph.D (Univ.Udayana)  
Ir. Putu Timur Ina, MS. (Univ, Udayana)  
Ir. Agus Selamet Djuniadji, Msi (Univ. Udayana)  
Putu Ari Sandhi W, S.TP., MP (Univ.Udayana)  
I Wayan Rai Widarta, S.TP., MSi (Univ.Udayana)  
Ni Nyoman Puspawati, S.TP., MSi (Univ.Udayana)  
Luh Putu Trisna Darmayanti, S.Hut., MP (Univ.Udayana)  
AA Istri Sri Wiadnyani, S.TP., M.Sc (Univ.Udayana)  
Ni Made Indri Hapsari, S.TP., MP (Univ.Udayana)  
IDP Kartika Pratiwi, S.TP., MP (Univ.Udayana)

**Produksi dan Distribusi**  
A.A. Ngurah Dwi Ariesta Wijaya Putra, S.TP.

#### Alamat Redaksi :

Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana  
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Telp./Fax. (0361) 701801, email : [itepa@unud.ac.id](mailto:itepa@unud.ac.id)

## DAFTAR ISI

**PERBANDINGAN MOCAF DENGAN TEPUNG KACANG MERAH DALAM PEMBUATAN BROWNIES KUKUS GLUTEN FREE CASEIN FREE (GFCF)**

*Hildha Ayu Massyta, I Gusti Ayu Ekawati, Ni Wayan Wisaniyasa..... 1*

**PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*) TERHADAP KARAKTERISTIK YOGHURT CAMPURAN SUSU SAPI DAN KACANG MERAH (*Phaseolus vulgaris*)**

*Dewi Citra Laksmi Agung Putri, I Nengah Kencana Putra, I Putu Suparhana..... 8*

**PENGARUH SUHU PENCELUPAN TERHADAP KARAKTERISTIK MINUMAN TEH HERBAL KULIT BUAH NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*)**

*I Komang Ardianta, Ni Made Yusa, I Nengah Kencana Putra..... 18*

**PENGARUH KONSENTRASI ETANOL TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG ILALANG (*Imperata cylindrica* (L) Beauv.) PADA EKSTRAKSI MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK**

*Corry Permatasari Suhendra, I Wayan Rai Widarta, Anak Agung Istri Sri Wiadnyani..... 27*

**PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN KARAKTERISTIK SENSORIS TEH WHITE PEONY**

*Dewa Ayu Tri Ulandari, Komang Ayu Nocianitri, Ni Made Indri Hapsari Arihantana ..... 36*

**PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG SUWEG (*Amorphophallus campanulatus*) DAN TEPUNG KACANG HIJAU (*Vigna radiate*) TERHADAP KARAKTERISTIK COOKIES**

*Putu Ayu Gaudiya Waisnawi, Ni Luh Ari Yusasrini, Putu Timur Ina..... 48*

**PENGARUH PERBANDINGAN TEPUNG HANJELI (*Coix lacryma-Jobi*, L.) DENGAN BUAH SALAK KERING (*Salacca edulis* Reinw.) TERHADAP KARAKTERISTIK SNACK BAR**

*Ni Putu Putri Dewanty Saraswati, I Gusti Ayu Ekawati, I Nengah Kencana Putra..... 57*

**PENGARUH PERBANDINGAN KENTANG KUKUS DAN TEPUNG KACANG HIJAU (*Phaseolus radiatus* L.) TERHADAP KARAKTERISTIK FLAKES**

*Lina Nindyawati, Putu Timur Ina, Anak Agung Istri Sri Wiadnyani ..... 66*

**STUDI CEMARAN MIKROBA PADA RENDANG SAPI DI RUMAH MAKAN PADANG DI KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI**

*Sixtian Brema Sembiring, I Nengah Kencana Putra, Ni Made Indri Hapsari Arihantana..... 75*

**PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TEH HERBAL KULIT KAKAO (*Theobroma cacao* L.)**

*I Gusti Ngurah Sujana Kusuma, I Nengah Kencana Putra, Luh Putu Trisna Darmayanti ..... 85*

**PENGARUH WAKTU EKSTRAKSI DAN KONSENTRASI ETANOL MENGGUNAKAN METODE MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION (MAE) TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK RAMBUT JAGUNG (*Zea mays* L.)**

*Yessica Kristanti, I Wayan Rai Widarta, I Dewa Gede Mayun Permana ..... 94*

**PENGARUH PERBANDINGAN SEMOLINA DAN TEPUNG BERAS HITAM TERHADAP KARAKTERISTIK PASTA FETTUCCINE BASAH**

*Ni Kadek Nova Wulandari, I Gusti Ayu Ekawati, I Nengah Kencana Putra ..... 104*

# PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN KARAKTERISTIK SENSORIS TEH WHITE PEONY

*by Komang Ayu Nocianitri*

---

**Submission date:** 27-Jul-2019 10:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1155390652

**File name:** 5.\_Tri\_Ulandari\_36-47.pdf (193.17K)

**Word count:** 5475

**Character count:** 31366

## PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN KARAKTERISTIK SENSORIS TEH WHITE PEONY

*The Effect of Drying Temperature on The Bioactive Component Contents and Sensory Characteristics of White Peony Tea*

Dava Ayu Tri Ulandari<sup>1)</sup>, Komang Ayu Nocianitri<sup>2)</sup>, Ni Made Indri Hapsari Arihantana<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Unud

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Unud

Kampus Bukit Jimbaran, Badung-Bali

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of drying temperature on the bioactive component contents of white peony tea and to know the proper drying temperature in white peony tea to produce the highest bioactive component contents and the best sensory characteristics. The experimental design used was Completely Randomized Design with a drying temperature as the treatment consisting of five levels: 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, and 100°C. The treatment was repeated 3 times to obtain 15 experiment units. The data obtained were analyzed by variance and if the treatment had an effect on the observed variable then continued with The Duncan Multiple Range Test. The results showed that the 90°C drying temperature treatment produced white peony tea with the highest bioactive component contents and the best sensory characteristics with water content 4,06% (wet basis), yield 52,54%, total phenolic 211,01 mg GAE/g tea, flavonoid 10,90 mg CE/g tea, catechin 3,55 mg/g tea, antioxidant activity 50,20%, brew color yellow and liked, astringent taste and usual, aroma liked and overall acceptance rather liked.

**Keywords :** white peony tea, drying temperature, flavonoids, catechins, antioxidant activity

### PENDAHULUAN

Teh putih adalah teh yang dibuat dari helaihan pucuk daun *Camellia sinensis* yang masih sangat muda dan diolah tanpa melalui proses oksidasi enzimatis seperti pada pengolahan teh hitam dan teh oolong (Anon., 2013). Teh putih secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, *silver needle* dan *white peony*.

Teh *silver needle* merupakan jenis teh putih yang umumnya lebih dikenal masyarakat dibandingkan teh *white peony*, namun jika dibandingkan dengan teh *silver needle*, *white peony* termasuk jenis teh putih yang memiliki rasa lebih khas serta harga jual yang lebih terjangkau, sehingga saat ini teh

*white peony* sedang dikembangkan di Bali oleh PT. Bali Cahaya Amerta, dimana tanaman teh khususnya varietas *sinensis* sebagai bahan baku pengolahan teh *white peony* berasal dari perkebunan perusahaan tersebut yang berlokasi di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Teh *white peony* dibuat tanpa melibatkan reaksi oksidasi enzimatis sama halnya dengan teh hijau, sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan-tahapan pengolahan teh *white peony* hampir sama dengan teh hijau, yaitu pemetikan, pelayuan, penggulungan, dan pengeringan. Bahan baku pengolahan teh *white peony* adalah pucuk ditambah satu sampai dua daun dibawah pucuk (p+1-2),

\*Korespondensi Penulis:  
Email: triulandari88@yahoo.com<sup>1)</sup>

sedangkan teh hijau adalah pucuk ditambah satu sampai tiga daun di bawah pucuk (p+1-3). Perbedaan teh *white peony* dengan teh hijau selain rumus petik adalah metode pelayuan serta banyaknya pengeringan selama proses pengolahan (Anon., 2017).

Bahan terpenting pada pengolahan teh putih adalah pucuk daun (peko) karena mengandung senyawa bioaktif tertinggi yang disebut polifenol dibandingkan bagian daun lainnya. Polifenol utama yang terdapat pada teh merupakan senyawa yang termasuk dalam kelas flavanol yaitu katekin (Hartoyo, 2003). Menurut Hilal dan Engelhardt (2007), kandungan total polifenol rata-rata pada teh putih adalah 21,54 g/100 g serta kandungan katekin pada teh putih adalah 13,22 g/100 g.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan jumlah katekin terbesar selama pengolahan teh terjadi pada tahap pelayuan (7,40%) serta penggilingan (6,70%) dan terkecil pada pengeringan akhir (1,60%) (Syah, 2006). Pengeringan pada pengolahan teh *white peony* merupakan proses yang melibatkan panas secara langsung serta dalam waktu yang cukup lama. Panas yang diterima selama pengolahan dapat menyebabkan terjadinya epimerisasi yang dapat menyebabkan penurunan jumlah katekin. Menurut penelitian Wang *et al.* (2008), katekin dapat mengalami epimerisasi pada suhu 98°C. Menurut penelitian Saklar *et al.* (2015), katekin pada teh hijau Turki mengalami epimerisasi pada suhu 95°C yang mendapat perlakuan panas selama 45 menit. Menurut penelitian Seto *et al.* (1997), katekin mengalami epimerisasi ketika dipanaskan pada suhu 120°C selama 30 menit.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh suhu pengeringan dalam pengolahan teh khususnya teh hijau terhadap kandungan bioaktif teh telah dilakukan seperti pada penelitian Roshanak *et al.* (2015) yang melaporkan bahwa suhu pengeringan 60°C menghasilkan total fenolik tertinggi yaitu 209,17 mg GAE/g serta aktivitas antioksidan

tertinggi ( $IC_{50}$  terendah) yaitu 167,166 µg/ml, sedangkan suhu pengeringan 100°C menghasilkan total flavonoid tertinggi yaitu 38,18 mg QE/g. Menurut Setyopratomo (2014), suhu pengeringan yang digunakan selama proses pengolahan teh hijau untuk mempertahankan kandungan komponen bioaktifnya sebaiknya tidak melebihi 100°C, sedangkan belum ada penelitian yang menyatakan suhu pengeringan yang tepat pada pengolahan teh *white peony*, maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu pengeringan terhadap komponen bioaktif dan karakteristik sensoris teh *white peony*.

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu

Pengolahan teh *white peony* dilaksanakan di PT. Bali Cahaya Amerta yang berlokasi di Jln. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.8, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Proses analisis dilaksanakan di UPT. Laboratorium Analitik, Laboratorium Terpadu Biosains dan Bioteknologi, Analisis Pangan, Pengolalan Pangan, serta Biokimia dan Nutrisi Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2018.

### Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari bahan baku dan bahan kimia. Bahan baku yang digunakan adalah daun teh varietas *sinensis* dengan rumus petik p+1-2 yang diperoleh dari perkebunan PT. Bali Cahaya Amerta yang berlokasi di Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bahan kimia yang digunakan antara lain: aseton 70%, metanol (p.a), metanol 85%, asam galat, reagen Folin-Ciocalteu, sodium karbonat ( $Na_2CO_3$  7,5%),  $AlCl_3$  10%, NaOH 1

M, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) 0,004%, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 0,5%, standar katekin dan aquades.

Alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain: tumpah pelayuan, oven, termometer, blender (*philips*), ayakan 60 mesh, rotary evaporator vakum, tabung reaksi (*pyrex*), labu takar (*pyrex*), kertas saring Whatman no. 1, orbital shaker (*biosan*), gelas ukur (*pyrex*), erlenmeyer 250 ml (*pyrex*), botol gelap, timbangan analitik (*sartorius*), mikropipet, pipet ukur (*pyrex*), cawan aluminium, spektrofotometer UV-Vis (*biochrom*) dan aluminium foil.

### Pelaksanaan Penelitian

#### 1. Pengolahan Teh *White Peony*

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan pengolahan teh *white peony* sebagai berikut.

##### a. Pemetikan daun teh

Pemetikan daun teh sebagai bahan baku teh *white peony* menggunakan rumus petik (p+1-2) yaitu pucuk (peko) ditambah satu sampai dua daun yang ada di bawah pucuk.

##### b. Sortasi

Setelah daun teh sampai di pabrik, dilakukan penerimaan bahan baku serta proses sortasi dengan memeriksa keadaan daun teh yang meliputi : kesesuaian rumus petik, keutuhan daun, dan kesegaran daun.

##### c. Pelayuan

Proses pelayuan dilakukan di ruang pelayuan pada suhu 27°C selama 20 jam dengan cara menghamparkan daun teh pada tumpah pelayuan yang kemudian disusun pada rak-rak pelayuan, lalu diangin-anginkan dengan bantuan kipas angin untuk membuat sirkulasi udara lebih lancar serta pengaturan suhu dengan bantuan AC (*Air Conditioner*). Selanjutnya, dilakukan pelayuan kembali dengan sinar matahari secara tidak langsung selama kurang lebih satu jam hingga muncul aroma khas pada daun teh.

##### d. Pengukusan (*Steaming*) <sup>2</sup>

Setelah memenuhi kriteria layu (pucuk layu yang berwarna hijau kekuningan, tidak

mengering, tangkai muda menjadi lentur, bila digenggam terasa lembut dan bila dilemparkan tidak akan buyar serta timbul aroma yang khas seperti buah masak), daun teh lalu dikukus dengan suhu 90°C selama 2 menit. Setelah itu diangin-anginkan kembali hingga dingin. Selanjutnya, dilakukan proses penggulungan.

##### e. Penggulungan

Penggulungan dilakukan dengan mesin *Top Roller* (TR) selama 5 menit hingga daun teh menggulung secara sempurna yang ditandai dengan daun menggulung dengan baik, bila dijatuhkan gulungannya tetap utuh, bila dipegang tidak menempel dan tidak mengeluarkan air, dan menghasilkan aroma yang khas.

##### f. Pengeringan

Proses pengeringan dilakukan dengan oven. Daun teh dimasukkan ke dalam oven dengan perlakuan suhu pengeringan (60°C, 70°C, 80°C, 90°C dan 100°C). Pengeringan dilakukan hingga daun teh memiliki ciri fisik : berwarna hijau kehitaman, muncul aroma khas seperti aroma karamel dan daun mudah dipatahkan serta akan hancur bila diremas. Proses pengeringan ini menyebabkan teh *white peony* memiliki kadar air 4-5%. Untuk mencapai kadar air tersebut, proses pengeringan dilakukan selama 90 menit pada suhu 60°C, 80 menit pada suhu 70°C, 70 menit pada suhu 80°C, 60 menit pada suhu 90°C dan 50 menit pada suhu 100°C.

#### 2. Proses Pembuatan Ekstrak Teh *White Peony*

Persiapan sampel untuk pengujian kadar total fenol, flavonoid, katekin dan aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode ekstraksi. Ekstraksi sampel dilakukan dengan cara teh *white peony* dihancurkan dengan blender. Setelah itu dilakukan pengayakan dengan ayakan 60 mesh. Ditimbang sampel uji, dimasukkan ke dalam *erlenmeyer* dan dilarutkan dengan aseton 70% dengan perbandingan sampel dan pelarut adalah 1:10

(b/v). Selanjutnya dishaker selama 60 menit dengan kecepatan 150 rpm, selanjutnya disaring dengan kertas saring whatman no.1. Filtrat yang diperoleh dipekakkan dengan rotary evaporator vakum pada suhu 30°C sehingga diperoleh ekstrak kasar daun teh (Druzynska, 2007 yang dimodifikasi; Shabri dan Rohdiana, 2016; Widarta dan Armata, 2017). Ekstrak kasar tersebut kemudian dilakukan pengujian terhadap kadar total fenol, total flavonoid, katekin dan aktivitas antioksidan.

### 3. Proses Penyeduhan Teh *White Peony* untuk Pengujian Karakteristik Sensoris

Pengujian terhadap karakteristik sensoris teh *white peony* dilakukan oleh 15 orang panelis semi terlatih dengan metode skoring terhadap warna dan rasa serta hedonik terhadap warna seduhan, aroma, rasa dan penerimaan keseluruhan. Metode penyeduhan teh *white peony* yaitu : ditimbang sebanyak 2 g sampel (dalam bentuk daun) pada setiap perlakuan. Disiapkan air panas dengan suhu 80°C sebanyak 150 ml. Daun teh diletakkan di dalam teko porselin, kemudian diseduh

1

Tabel 1. Nilai rata-rata kadar air, rendemen, total fenol, flavonoid, katekin dan aktivitas antioksidan teh *white peony*

Suhu Pengeringan	Kadar air (% b/b)	Rendemen ekstrak (%)	Total fenol (mg GAE/g teh)	Flavonoid (mg CE/g teh)	Katekin (mg/g teh)	Aktivitas antioksidan (%)
60°C	6,88 ± 0,01 a	42,95 ± 2,2 c	159,63 ± 5,6 c	6,45 ± 0,2 e	2,60 ± 0,1 c	43,28 ± 2,2 c
70°C	5,44 ± 0,09 b	46,15 ± 0,8 b	169,58 ± 1,9 c	7,95 ± 0,3 d	3,06 ± 0,02 b	44,88 ± 0,7 bc
80°C	5,27 ± 0,08 c	48,54 ± 1,5 b	180,60 ± 7,6 b	8,98 ± 0,3 c	3,02 ± 0,09 b	46,85 ± 1,7 b
90°C	4,06 ± 0,05 d	52,54 ± 0,8 a	211,01 ± 6,7 a	10,90 ± 0,2 b	3,55 ± 0,04 a	50,20 ± 1,0 a
100°C	3,62 ± 0,04 e	46,99 ± 2,3 b	146,21 ± 3,7 d	11,70 ± 0,6 a	2,87 ± 0,2 b	43,95 ± 2,6 bc

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata ( $P>0,05$ )

### Kadar Air

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kadar air teh *white peony*. Rata-rata kadar air teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Kadar air teh *white peony* berkisar antara 3,62% (b/b) hingga 6,88% (b/b). Hal ini

dengan air tersebut dan didiamkan selama 5 menit. Sampel dengan perlakuan suhu pengeringan yang berbeda diberikan kode yang berbeda. Lalu disajikan pada gelas untuk diujikan kepada panelis.

### Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kadar air (AOAC, 1995), rendemen ekstrak (Handayani *et al.*, 2016), total fenol (Sakanaka *et al.*, 2003), flavonoid (Chang *et al.*, 2006), katekin (Ramlah, 2017) aktivitas antioksidan (Vasic *et al.*, 2012 yang dimodifikasi), serta karakteristik sensoris yang meliputi: warna, rasa, aroma, dan penerimaan keseluruhan terhadap seduhan teh *white peony* (Soekarto, 1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kadar air, rendemen, total fenol, flavonoid, katekin dan aktivitas antioksidan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Kadar total fenol, flavonoid, katekin dan aktivitas antioksidan dihitung dalam bahan kering (b/k).

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3836-2013) mengenai standar mutu teh (*Camellia sinensis*) kering dalam kemasan, yaitu kadar air maksimal adalah 8% (b/b). Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 60°C yaitu 6,88%, sedangkan kadar air terendah diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan

100°C yaitu 3,62%. Semakin tinggi suhu pengeringan maka terjadi penurunan kadar air. Menurut Taib *et al.* (1997) dalam Fitriani (2008), hal ini terjadi karena meningkatnya kemampuan suatu bahan untuk melepaskan air dari permukaannya seiring dengan meningkatnya suhu udara pengering. Menurut Winarno (1995), semakin tinggi suhu pengeringan maka semakin cepat terjadi penguapan, sehingga kandungan air di dalam bahan semakin rendah.

#### Rendemen Ekstrak

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap rendemen ekstrak teh *white peony*. Rata-rata rendemen ekstrak teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Rendemen tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 90°C yaitu 52,54% dan terendah pada suhu 60°C yaitu 42,95%. Rendemen ekstrak mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya suhu pengeringan, namun mengalami penurunan pada suhu pengeringan 100°C. Hal ini terjadi karena panas yang digunakan selama proses pengeringan dapat menyebabkan kerusakan protein, karbohidrat dan komponen-komponen penyusun dinding sel (Chu dan Juneja, 1997). Kerusakan komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan pembukaan sistem membran sel secara optimal, sehingga proses ekstraksi dapat terjadi lebih sempurna, namun pengeringan dengan suhu yang terlalu tinggi yaitu 100°C dapat menyebabkan penurunan rendemen pada ekstrak akibat membran sel membuka sangat maksimal yang akhirnya menyebabkan kerusakan terhadap komponen-komponen penyusun membran sel (Chu dan Juneja, 1997). Nilai rendemen dapat digunakan untuk memperkirakan banyaknya senyawa bioaktif yang terdapat pada bahan (Martono, 2016).

#### Total Fenol

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kandungan total fenol teh *white peony*. Rata-rata total fenol teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Total fenol tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 90°C yaitu 211,01 mg GAE/g teh dan terendah pada suhu 100°C yaitu 146,21 mg GAE/g teh. Semakin meningkatnya suhu pengeringan menyebabkan total fenol teh *white peony* semakin tinggi, namun suhu pengeringan yang terlalu tinggi yaitu pada suhu 100°C dapat menyebabkan penurunan kadar total fenol. Hal ini terjadi karena panas dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap komponen penyusun dinding sel daun yaitu karbohidrat (termasuk serat selulosa) dan protein sebagai komponen tidak larut. Kerusakan ini dapat memudahkan keluarnya senyawa polifenol dari dalam daun karena polifenol merupakan senyawa yang memiliki berat molekul rendah, sehingga mudah untuk terinfusi ke dalam pelarut (Chu dan Juneja, 1997). Proses pemanasan saat pengeringan juga berfungsi untuk menginaktivasi enzim polifenol oksidase (Tuminah, 2004). Semakin tinggi suhu pengeringan mengakibatkan peningkatan proses inaktivasi enzim polifenol oksidase, sehingga aktivitas enzim akan semakin rendah dan kerusakan senyawa polifenol semakin sedikit, namun jika suhu pengeringan melampaui suhu optimum, maka stabilitas senyawa polifenol akan terganggu sehingga dapat menyebabkan penurunan kandungan senyawa polifenol pada bahan (Susanti, 2008).

#### Total Flavonoid

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kandungan flavonoid teh *white peony*. Rata-rata kandungan flavonoid teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan flavonoid tertinggi diperoleh pada perlakuan

suhu pengeringan 100°C yaitu 11,70 mg CE/g teh dan terendah pada suhu 60°C yaitu 6,45 mg CE/g teh. Hal ini terjadi karena proses pengeringan pada daun teh segar dapat menghancurkan lapisan lilin yang ada di permukaan luar daun dan selanjutnya akan memecah dinding sel sehingga akan memudahkan senyawa flavonoid untuk berdifusi ke dalam pelarut (Setyopratomo, 2014). Semakin tinggi suhu pengeringan menyebabkan semakin tinggi pula kerusakan terhadap dinding sel, sehingga semakin tinggi jumlah senyawa flavonoid yang berdifusi ke dalam pelarut. Komponen flavonoid yang banyak terdapat di dalam daun teh adalah katekin, flavonol glikosida, dan flavon C-glikosida (Handoko, 2007). Menurut Jeong *et al.* (2004), perlakuan pemanasan pada bahan dapat menyebabkan keluarnya beberapa senyawa fenolik dengan berat molekul rendah, dimana flavonoid yang terdapat pada teh merupakan senyawa fenolik yang memiliki berat molekul rendah. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu ketika teh *white peony* dipanaskan pada suhu 100°C, masih memungkinkan senyawa flavonoid untuk keluar dari dalam sel khususnya dari bagian vakuola sel, sehingga didapatkan kadar flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan suhu pengeringan lainnya.

### Katekin

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap kandungan katekin teh *white peony*. Rata-rata kandungan katekin teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan katekin tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 90°C yaitu 3,55 mg/g teh dan terendah pada suhu 60°C yaitu 2,60 mg/g teh. Pengeringan pada suhu 70, 80 dan 100°C menunjukkan perbedaan tidak nyata terhadap kandungan katekin teh *white peony*. Kadar katekin mengalami peningkatan seiring

meningkatnya suhu pengeringan sampai mencapai titik optimum dan akhirnya mengalami penurunan. Katekin merupakan senyawa yang kurang stabil dan mudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh panas yang berlebih selama proses pengeringan (Nindiyasari, 2012). Suhu pengeringan yang melebihi 90°C selama pengeringan teh *white peony*, dapat menyebabkan kerusakan pada katekin. Katekin yang utama dalam teh adalah *epicatechin* (EC), *epicatechin gallate* (ECG), *epigallocatechin* (EGC), dan *epigallocatechin gallate* (EGCG). Jika katekin mengalami kerusakan oleh panas, maka EGCG, ECG, EGC dan EC akan mengalami epimerisasi menjadi *gallocatechin gallate* (GCG), *catechin gallate* (CG), *gallocatechin* (GC), dan *catechin* (C) (Chen *et al.*, 2001). Epimerisasi ini menyebabkan kadar katekin total akan menurun (Setyopratomo, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian Wang *et al.*, 2008, yaitu katekin dapat mengalami epimerisasi pada suhu 98°C dimana epimerisasi ini menyebabkan menurunnya total katekin seiring dengan meningkatnya suhu pemanasan.

### 1

#### Aktivitas Antioksidan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan pada proses pengolahan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap aktivitas antioksidan teh *white peony*. Rata-rata aktivitas antioksidan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 1. Aktivitas antioksidan tertinggi diperoleh pada perlakuan suhu pengeringan 90°C yaitu 50,20% dan terendah pada suhu 60°C yaitu 43,28%. Perlakuan pengeringan pada suhu 70 dan 100°C menunjukkan perbedaan tidak nyata terhadap aktivitas antioksidan teh *white peony*. Aktivitas antioksidan teh *white peony* dipengaruhi oleh kadar total fenol, flavonoid dan katekin.

Suhu pengeringan yang terlalu tinggi yaitu 100°C menyebabkan penurunan terhadap

aktivitas antioksidan. Hal ini terjadi karena katekin yang terdapat pada daun teh merupakan metabolit sekunder yang termasuk senyawa polifenol dan tergolong sebagai flavonoid yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas yang terlalu tinggi. Katekin merupakan senyawa yang memiliki sifat sebagai antioksidan (Hasanah, 2012). Gugus hidrosil fenolik yang dimiliki oleh katekin merupakan donor elektron yang potensial untuk berikatan dengan radikal bebas (Ramlah, 2017). Menurut Handoko (2007), polifenol katekin memiliki aktivitas antioksidan lebih besar jika dibandingkan dengan vitamin C atau  $\beta$ -karoten.

Perlakuan dengan aktivitas antioksidan tertinggi yaitu pada suhu pengeringan 90°C dilakukan pengujian terhadap IC<sub>50</sub>. Nilai IC<sub>50</sub> diperoleh pada konsentrasi 4,97 mg/L. Hal ini berarti bahwa pada konsentrasi 4,97 mg/L, teh *white peony* dapat menghambat radikal bebas

<sup>1</sup> sebanyak 50%. Nilai IC<sub>50</sub> yang semakin kecil, menunjukkan kemampuan antioksidan yang lebih tinggi dalam menangkal radikal bebas. Bahan yang memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar < 50 ppm memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat (Molyneux, 2004). Teh *white peony* memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar 4,97 mg/L, sehingga dapat digolongkan sebagai bahan yang memiliki sifat antioksidan sangat kuat.

#### Sifat Sensoris

Evaluasi sensoris teh *white peony* dilakukan dengan uji hedonik dan skoring. Uji hedonik dilakukan terhadap warna, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan. Nilai rata-rata uji hedonik terhadap warna, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai rata-rata uji skoring terhadap warna dan rasa teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Nilai rata-rata uji hedonik terhadap warna, rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan teh *white peony*

Suhu Pengeringan	Warna	Rasa	Aroma	Penerimaan keseluruhan
60°C	6,07 ± 0,5 a	5,93 ± 0,5 a	6,07 ± 0,5 ab	5,87 ± 0,6 a
70°C	6,20 ± 0,6 a	5,20 ± 1,1 b	6,33 ± 0,6 a	5,53 ± 0,9 ab
80°C	6,00 ± 0,7 a	5,60 ± 1,0 ab	5,73 ± 0,6 bc	5,80 ± 0,7 ab
90°C	6,07 ± 0,6 a	4,47 ± 1,4 c	5,67 ± 0,5 c	5,47 ± 0,6 <b>a</b>
100°C	6,00 ± 0,5 a	5,40 ± 0,8 b	6,00 ± 1,0 abc	5,73 ± 1,0 ab

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata ( $P>0,05$ )

Kriteria hedonik : 1 (sangat tidak suka); 2 (tidak suka); 3 (agak tidak suka); 4 (biasa); 5 (agak suka); 6 (suka); 7 (sangat suka)

Tabel 3. Nilai rata-rata uji skoring terhadap warna dan rasa teh *white peony*

Suhu Pengeringan	Warna	Rasa
60°C	2,93 ± 0,5 c	3,73 ± 0,6 a
70°C	3,47 ± 0,6 a	2,73 ± 0,7 b
80°C	3,20 ± 0,4 b	3,07 ± 0,7 b
90°C	3,33 ± 0,5 ab	2,33 ± 1,0 <b>a</b>
100°C	2,67 ± 0,5 d	3,80 ± 0,7 a

Keterangan : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata ( $P>0,05$ )

Nilai skoring warna : 1 (bening); 2 (kuning muda); 3 (kuning); 4 (kuning tua);  
5 (kuning kecokelatan)

Nilai skoring rasa : 1 (sangat sepat); 2 (sepat); 3 (agak sepat); 4 (agak tidak sepat); 5 (tidak sepat)

### Warna

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh tidak nyata ( $P>0,05$ ) terhadap warna seduhan teh *white peony* yang dilakukan dengan uji hedonik. Rata-rata hasil uji hedonik terhadap warna seduhan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap warna seduhan teh *white peony* berkisar antara 6,00-6,20 dengan kriteria suka. Kesukaan panelis terhadap warna seduhan teh *white peony* kemudian dilanjutkan dengan uji skoring.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap warna seduhan teh *white peony* yang dilakukan dengan uji skoring. Rata-rata hasil uji skoring<sup>1</sup> terhadap warna seduhan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rata-rata warna seduhan teh *white peony* berkisar antara 2,67-3,47 dengan kriteria warna seduhan adalah kuning. Kadar flavonoid tertinggi dapat dilihat dari warna seduhan yang dihasilkan. Warna yang lebih pekat menunjukkan kadar flavonoid yang tinggi dengan aktivitas antioksidan yang tinggi pula (Ramlah, 2017). Flavonoid dapat memberi warna kuning kecokelatan pada seduhan dan akan berubah menjadi cokelat gelap bila terjadi reaksi oksidasi lebih lanjut (Winardi, 2010). Perlakuan suhu pengeringan 70, 80 dan 90°C memberikan perbedaan tidak nyata terhadap warna seduhan teh *white peony* yaitu cenderung berwarna kuning, sedangkan suhu pengeringan 60 dan 100°C menyebabkan warna kuning yang lebih muda karena mengandung senyawa flavonoid yang lebih sedikit.

### Rasa

Hasil sidik ragam menunjukkan pengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap rasa teh *white peony* yang dilakukan dengan uji hedonik. Rata-rata hasil uji hedonik atau kesukaan terhadap rasa teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai rata-rata kesukaan panelis

terhadap rasa teh *white peony* berkisar antara 4,47-5,93 dengan kriteria biasa-suka. Rasa sepat yang ada pada seduhan teh *white peony* cenderung menurunkan tingkat kesukaan panelis, sehingga untuk mengetahui tingkat kesepatan rasa teh *white peony*, dilanjutkan dengan uji skoring.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap rasa teh *white peony* yang dilakukan dengan uji skoring. Rata-rata hasil uji skoring terhadap rasa teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rata-rata rasa teh *white peony* berkisar antara 2,33-3,80 dengan kriteria sepat-agak tidak sepat. Perlakuan suhu pengeringan 60 dan 100°C cenderung menimbulkan rasa agak tidak sepat pada seduhan teh *white peony*, suhu pengeringan 70 dan 80°C cenderung menimbulkan rasa agak sepat serta suhu pengeringan 90°C cenderung menimbulkan rasa sepat. Rasa sepat yang timbul disebabkan adanya senyawa katekin. Katekin dapat memberi rasa pahit dan sepat pada seduhan teh (Ramlah, 2017), sehingga semakin tinggi kandungan katekin pada teh *white peony* maka rasa dari teh tersebut akan semakin sepat. *Epicatechin* (EC) dan *epigallocatechin* (EGC) yang merupakan bagian dari katekin, mampu memunculkan rasa sedikit sepat dengan sedikit manis setelah diminum, sedangkan bentuk *gallatanya* (EGC dan EGCG) memunculkan rasa sepat yang kuat (Yamanishi, 1991 dalam Mitrowihardjo, 2012).

### Aroma

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap aroma teh *white peony* yang dilakukan dengan uji hedonik atau kesukaan. Rata-rata hasil uji hedonik terhadap aroma teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai rata-rata aroma teh *white peony* berkisar antara 5,67-6,33 dengan kriteria suka. Menurut Ciptadi dan Nasution (1979),

senyawa pembentuk aroma teh terutama terdiri dari minyak atsiri yang bersifat mudah menguap dan bersifat mudah direduksi sehingga dapat menghasilkan aroma harum pada teh, selain itu teh juga mengandung senyawa asam galat. Ke<sup>2</sup>ka terjadi proses pengeringan pada teh, asam galat akan teroksidasi menjadi senyawa thearubigin (TR). Senyawa thearubigin bertanggungjawab pada aroma harum yang ada pada seduhan teh (Kim et al., 2011).

### 1

#### Penerimaan keseluruhan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh tidak nyata ( $P>0,05$ ) terhadap penerimaan keseluruhan teh *white peony* yang di<sup>1</sup>tukar dengan uji hedonik atau kesukaan. Rata-rata hasil uji hedonik terhadap penerimaan keseluruhan teh *white peony* dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai rata-rata penerimaan keseluruhan teh *white peony* berkisar antara 5,47-5,87 dengan kriteria agak suka-suka. Perlakuan suhu pengeringan 60, 80 dan 100°C cenderung disukai panelis, sedangkan suhu pengeringan 70 dan 90°C cenderung agak disukai panelis. Karakteristik sensoris yang sangat mempengaruhi penerimaan keseluruhan panelis terhadap teh *white peony* adalah rasa seduhan teh, sehingga semakin sepat rasa seduhan teh *white peony*, kesukaan panelis akan menurun.

### 1

#### SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Suhu pengeringan pada proses pengolahan teh *white peony* berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, rendemen ekstrak, total fenol, flavonoid, katekin, aktivitas antioksidan, warna (uji skoring), rasa (uji skoring dan hedonik) serta aroma (uji hedonik).
2. Suhu pengeringan 90°C menghasilkan teh *white peony* dengan kandungan komponen

bioaktif tertinggi dan karakteristik sensoris terbaik yaitu : kadar air 4,06%, rendemen 52,54%, kadar total fenol 211,01 mg GAE/g teh, flavonoid 10,90 mg CE/g teh, katekin 3,55 mg/g teh, aktivitas antioksidan 50,20%, warna seduhan kuning dan disukai, rasa sepat dan biasa, aroma disukai dan penerimaan keseluruhan agak suka.

##### Saran

Adapaun saran yang dapat diberikan yaitu proses pengeringan dalam pengolahan teh *white peony* untuk memperoleh produk teh dengan kandungan komponen bioaktif tertinggi dan karakterisrik sensoris terbaik sebaiknya dilakukan pada suhu 90°C selama 60 menit hingga memiliki ciri fisik yaitu daun berwarna hijau kehitaman, muncul aroma khas seperti aroma karamel, daun mudah dipatahkan serta akan hancur bila diremas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2013. Teh Putih yang Langka dan Mahal.  
<http://balittri.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/info-teknologi/177-teh-putih-yang-langka-dan-mahal>. Diakses tanggal 21 Oktober 2018.
- Anonimus. 2017. Proses Pengolahan dan Standar Mutu Teh *White peony*. PT. Bali Cahaya Amerta, Denpasar.
- AOAC, 1995. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. Benjamin Franklin Station, Washington DC.
- Ciptadi, W. dan M. Z. Nasution. 1979. Mempelajari Cara Pemanfaatan Teh Hitam Mutu Rendah untuk Pembuatan Teh Dadak. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Chang, Q., Z. Zuo, M.S.S. Chow danW.K.K. Ho. 2006. Effect of storage temperature

- on phenolics stability in hawthorn (*Crataegus pinnatifida* Var. Major) fruits and a hawthorn drink. *Food Chemistry*. 98(3):426-430.
- Chen, Z.Y., Q.Y. Zhu., D. Tsang., Y. Huang. 2001. Degradation of green tea catechin in tea drinks. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*. 49:477-482.
- 3 Chu, D.C dan L.R. Juneja. 1997. *General Chemical Composition of Green Tea and Its Infusion Chemistry and Applications of Green Tea*. CRC Press LLC., USA, p.13- 21.
- Druzynska, B., A. Stepniewska dan R. Wolosiak. 2007. The influence of time and type of solvent on efficiency of the extraction of polyphenols from green tea and antioxidant properties obtained extracts. *Journal of Technologia Alimentaria*. 6(1): 27-36.
- Fitriani, S. 2008. Pengaruh suhu dan lama pengeringan terhadap beberapa mutu manisan belimbing wuluh (*Averrhoa bellimbi* L.). *Jurnal SAGU*. 7(1):32-37.
- Handoko, D. 2007. Pengaruh Tekanan Dan Suhu Pada Kondisi Evaporasi Ekstrak Daun Teh Hijau. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Handayani, H., F.H. Srihefyna dan Yunianta. 2016. Ekstraksi antioksidan daun sirsak metode ultrasonic bath (kajian rasio bahan: pelarut dan lama ekstraksi). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*. 4(1):262-272.
- Hartoyo, A. 2003. Teh dan Khasiatnya bagi Kesehatan. Kanisius, Yogyakarta.
- Hasanah, S.U., S. Hamdani dan A. Firmansyah. 2012. Perbandingan kadar katekin dari beberapa jenis kualitas teh hitam (*camellia sinensis* l.[o] kuntze) di pusat penelitian teh dan kina (pptk) gambung. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 1(1):7-12.
- Hilal, Y dan U. Engelhardt. 2007. Characterisation of white tea – comparison to green and black tea. *Journal of Consumer Protection and Food Safety*. 2:414-421.
- 4 Jeong, S. M., S.Y. Kim., D.R. Kim., S.C. Jo., K.C. Nam., D.U. Ahn dan S.C. Lee. 2004. Effect of heat treatment on the antioxidant activity of extracts from citrus peels. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 52:3389–3393.
- Kim, Y., K.L. Goodner., J. Park., J. Choi dan S.T. Talcott. 2011. Changes in antioxidant phytochemical and volatile composition of *Camellia sinensis* by oxidation during tea fermentation. *Food Chem*. 129:1331-1342.
- Martono, B., S. Falah dan E. Nurlela. 2016. Aktivitas antioksidan teh varietas gmb 7 pada beberapa ketinggian tempat. *J. TIDP*. 3(1):53–60.
- Mitrowihardjo, S. 2012. Kandungan Katekin Dan Hasil Pucuk Beberapa Klon Teh (*Camelia sinensis* (L.) O. Kuntze) Unggulan pada Ketinggian yang Berbeda di Kebun Pagilaran. *Disertasi*. Tidak dipublikasikan. Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta.
- Molyneux, P. 2004. The use of stable radical diphenylpicril-hydrazone (dpph) for estimating antioxidant activity. *Songklanakarin Journal of Science Technology*. 26(2):211–219.
- 1 Nindyasari, S. 2012. Pengaruh Suhu dan Waktu Penyeduhan Teh Hijau (*Camellia sinensis*) serta Proses Pencernaan In

- Vitro terhadap Aktivitas Inhibisi Lipase. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Bogor.
- Ramlah. 2017. Penentuan Suhu Dan Waktu Optimum Penyeduhan Daun Teh Hijau (*Camellia Sintesis L.*) P+2 Terhadap Kandungan Antioksidan Kafein, Tanin Dan Katekin. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Makassar.
- Roshanak, S., M. Rahimmalek dan S.A.H. Goli. 2015. Evaluation of seven different drying treatments in respect to total flavonoid, phenolic, vitamin c content, chlorophyll, antioxidant activity and color of green tea (*Camellia sinensis* or *C. Assamica*) leaves. Journal of Food Science Technology. 53(1):721-729.
- <sup>1</sup> Sakanaka, S., Y. Tachibana., Y. Okada. 2003. Preparation and antioxidant properties of extracts of Japanese persimo leaf tea (kakinocha-cha). Food chemistry. 89:569-575.
- Saklar, S., E. Ertas., S. Ibrahim., Ozdemir dan B. Karadeniz. 2015. Effects of different brewing conditions on catechin content and sensory acceptance in Turkish green tea infusions. J Food Sci Technol. DOI 10.1007/s13197-015-1746-y.
- Seto, R., H. Nakamura., F. Nanjo dan Y. Hara. 1997. Preparation of epimers of tea catechins by heat treatment. Journal of Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 61(9):1434-1439.
- Setyopratomo, P. 2014. Extraction of phenolic compounds from green tea using ethanol. Journal of Engineering and Applied Sciences. 9(9):1516-1521.
- Shabri dan D. Rohdiana. 2016. Optimasi Dan Karakterisasi Ekstrak Polifenol The Hijau Dari Berbagai Pelarut. Jurnal Penelitian Teh dan Kina. 19(1):57-66.
- Soekarto, S.T. 1985. Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian. Bhratara Aksara, Jakarta.
- Susanti, D.Y. 2008. Efek Suhu Pengeringan terhadap Kandungan Fenolik dan Kandungan Katekin Ekstrak Daun Kering Gambir. Prosiding Seminar Nasional Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syah, A.N.A. 2006. Taklukkan Penyakit dengan Teh Hijau. PT. Agromedia Pustaka, Tangerang.
- Taib, G., G. Said dan S. Wiraatmadja. 1997. Operasi Pengeringan Pada Pengolahan Hasil Pertanian. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Tuminah S. 2004. Teh [*Camellia sinensis* o. k var. *assamica* (mast)] sebagai salah satu sumber antioksidan. J Cermin Dunia Kedokteran. 144:52-54.
- Vasic, S.M., O.D. Stefanovic., B.Z. Licina., I.D. Radojevic dan L.R. Comic. 2012. Biological activities of extracts from cultivated *Granadilla passiflora alata*. EXLI Journal. 11:20821-ISSN 1611-2156.
- Wang, R., W. Zou dan X. Jiang. 2008. Reaction kinetics of degradation and epimerization of epigallocatechin gallate (egcg) in aqueous system over a wide temperature range. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 56(8): 2694-2701.
- <sup>1</sup> Widarta, I.W.R dan I.W. Arnata. 2017. Ekstraksi komponen bioaktif daun alpukat dengan bantuan ultrasonik pada berbagai jenis dan konsentrasi pelarut. Jurnal Agritech. 37(2):148-157.


Winardi, R.R. 2010. Perubahan kadar flavonoid selama fermentasi seduhan teh hijau dan potensi khasiatnya. Jurnal Saintech. 2(3):63-68.

Winarno, F.G. 1995. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yamanishi, T. 1999. Tea Flavor. In Jain N.K. (Ed). Global Advances in Tea Science. Aravali Book International Ltd., New Delhi, p. 707-722.

# PENGARUH SUHU PENGERINGAN TERHADAP KANDUNGAN KOMPONEN BIOAKTIF DAN KARAKTERISTIK SENSORIS TEH WHITE PEONY

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper                      | 13% |
| 2 | Submitted to Universitas Diponegoro<br>Student Paper                  | 1 % |
| 3 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta<br>Student Paper              | 1 % |
| 4 | Submitted to Higher Education Commission<br>Pakistan<br>Student Paper | 1 % |
| 5 | Submitted to Universitas Andalas<br>Student Paper                     | 1 % |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On