

HOME / ARCHIVES / Vol 8 No 1 (2020): April



**DOI:** <https://doi.org/10.24843/JBETA.2020.v08.i01>

**PUBLISHED:** 2019-06-19

[Editor in Chief](#)

Gede Arda, S.TP., M.Sc. ([GS](#)); ([ORCID](#)); ([Sinta](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

[Managing Editor](#)

I. A. Gede Bintang Madrini, S.TP., M.Agr. Ph.D. ([GS](#)); ([Sinta](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

[Editorial Boards](#)

Dr. Ir. I Wayan Widia, MSIE. ([GS](#)); ([Sinta](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suolpta, M.B. ([GS](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

Prof. Ir. I Made Supartha Utama, M.B., Ph.D. ([GS](#)); ([Sinta](#)); ([Scopus](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

Dr. Sumiyati, S.TP., MP. ([GS](#)); ([SINTA](#)); Agricultural Engineering Department, Faculty of Agricultural Technology, Udayana University, Indonesia

Prof. Ir. I Made Anom B. Wilaya, M.App. Sc., Ph.D. ([GS](#)); ([Sinta](#)); ([Scopus](#)); Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Indonesia

Dewi Sri Jayanti, . ([GS](#)); ([Sinta](#)); ([Scopus](#)); Department of Agriculture Engineering, Universitas Syiah Kuala, Nangro Aceh Darussalam, Indonesia

Cicih Sugianti, S.TP., M.Si. ([GS](#)); ([Sinta](#)); Jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung

e-ISSN 2502-3012

[Focus and Scope](#)  
[Ethics Statement](#)  
[Author Guidelines](#)  
[Author Fees](#)  
[Peer Review Process](#)  
[Open Access Policy](#)  
[Copyright Notice](#)  
[Submissions](#)  
[Editorial Teams](#)  
[Reviewer](#)  
[Screening for Plagiarism](#)  
[Contact](#)

## Tools

Mendeley



Zotero



Turnitin



Guidelines in Brief

Template



Checklist for Formating



Pengaruh Penambahan Pelepas Rebung Bambu (*Gigantochloa nigrociliata* Bluse-KURZ) dan Konsentrasi Aktivator Terhadap Kualitas Kompos yang Dihasilkan

Daniel Rama Prawiratama, I Wayan Widia, I Nyoman Sudipta

25-34



**PUBLISHED ARTICLE**

DOI : <https://doi.org/10.24843/BETA.2020.v08.i01.p04>

Abstract views: 28, Published article downloads: 23

Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Pada Perusahaan Penyosohan Beras di Desa Jagapati, Angantaka, Sedang kec. Ablansemal kab. Badung

Krisna Dwipayana, I Nyoman Sudipta, I Putu Gede Budisanjaya

35-44

Indexed by

Google Scholar



Dimensions



Sinta



Garuda



Statistic

Pendugaan Umur Simpan Ikan Kakap Putih Olahan dengan Pengaplikasian Asap Cair Bambu Tabah (*Gigantochloa nigrociliata* Bluse-Kurz) dalam Pengemasan Vakum

Stefani Sitanggang, Ida Ayu Rina, Ida Bagus Putu Gunadnyia

45-54

**PUBLISHED ARTICLE**

DOI : <https://doi.org/10.24843/BETA.2020.v08.i01.p05>

Abstract views: 20, Published article downloads: 19

Pengaruh Konentrasi Ethephon dan Masa Simpan pada Proses Degreening Buah Jeruk Silam (*Citrus nobilis* Lour var. microcarpa)

Ali Muhamad Prabowo, IBP Gunadnyia, I Nyoman Sudipta

55-61

**PUBLISHED ARTICLE**

DOI : <https://doi.org/10.24843/BETA.2020.v08.i01.p06>

Abstract views: 37, Published article downloads: 48

Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Bayam (*Ammaranthus tricolor*) Secara Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique)

I Made Suarjana, I Gusti Ngurah Apriadi Antantara, Gede Arda

62-70

**PUBLISHED ARTICLE**

DOI : <https://doi.org/10.24843/BETA.2020.v08.i01.p07>

Abstract views: 42, Published article downloads: 132

# Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Ikan Tongkol

*by* Wayan Widia

---

**Submission date:** 15-Jul-2020 07:17PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1357801532

**File name:** engovenan\_Ikan\_Tongkol\_yang\_direnda,\_dalam\_Larutan\_Asap\_Cair.pdf (1.06M)

**Word count:** 5524

**Character count:** 31962

**Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Ikan Tongkol yang direndam dalam Larutan Asap Cair Batang Bambu Tabah terhadap Karakteristik Produk Ikan Olahan**

*Effect of Temperature and Duration Heating Using Oven in Tuna which soaked Liquid Smoke Stems Tabah Bamboo Solution to the Characteristics of Processed Fish Products*

**Luber Perkasa Turnip, I Wayan Widia\*, Pande Ketut Diah Kencana**

*Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana*

\*email: wayanwidia@unud.ac.id

**Abstrak**

Ikan tongkol memiliki kandungan protein **50** kadar air yang tinggi, serta memiliki daging yang padat. Akan tetapi, ikan tongkol juga sangat mudah mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan ikan adalah **kadar air yang tinggi** yang dapat menyebabkan mikroorganisme berkembang biak dengan mudah. Pengasapan dengan asap cair lebih aman dan lebih praktis daripada pengasapan secara konvensional karena asap cair mengandung **fenol, karbonil dan asam** organik yang berguna untuk memberikan rasa khas dan sebagai **gawet** pada ikan. Asap cair berasal dari batang bambu tabah (*Gigantochloa nigrociliata* Buse-Kurz). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu pengovenan ikan tongkol **36** yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah terhadap karakteristik produk olahan ikan dan untuk mengetahui suhu dan waktu pengovenan terbaik terhadap **21** karakteristik organoleptik ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah perlakuan suhu pengovenan yang terdiri dari tiga level, dan faktor kedua adalah perlakuan waktu pengovenan yang terdiri dari tiga level. Setiap perlakuan diulang sebanyak dua kali. Kombinasi perlakuan terbaik adalah suhu pengovenan 100°C, waktu pengovenan selama 4 jam menghasilkan pH 5,5, kadar air 58,06%, kadar abu 1,69%, kadar protein 18,29%, warna 3,94, aroma 4,28, tekstur 4,72, rasa 4,5, dan penerimaan keseluruhan 4,39.

**Kata kunci :** ikan tongkol asap, asap cair, bambu tabah.

**Abstract**

Tuna has a high protein and water content, and has solid meat. But tuna is also very easy to damage. The cause of damage fish is a high water content which can cause microorganisms to multiply easily. Fumigation with liquid smoke is safer and more practical than conventional fumigation, because liquid smoke contains phenol, carbonyl and organic acids which are useful for providing a distinctive taste and as preservatives in fish. The liquid smoke comes from stem of tabah bamboo (*Gigantochloa nigrociliata* Buse-Kurz). The purpose of this study was to determine effect of temperature and duration heating using oven in tuna which soaked liquid smoke stems tabah bamboo solution to the characteristics of processed fish products and to find out the temperature and duration heating using oven of the best organoleptic characteristics of tuna which soaked liquid smoke stems tabah bamboo solution. The method used is Factorial Completely Randomized Design **40** in two factors. The first factor is the treatment of oven temperature which consists of three levels, and the second factor is the treatment of oven time which consists of three levels. Each treatment was repeated twice. The best combination of treatments is the oven temperature of 100°C, oven for 4 hours produce pH 5.5, water content 58.06%, ash content 1.69%, protein content 18.29%, color 3.94, aroma 4.28, texture 4.72, taste 4.5, and the overall acceptance 4.39.

**Keyword :** smoked tuna, liquid smoke, tabah bamboo.

**PENDAHULUAN**

**49**

Ikan tongkol merupakan salah satu jenis ikan yang produksinya cukup besar **ya** **63** diperoleh dari perairan Indonesia. Ikan tongkol memiliki kandungan protein dan kadar air yang tinggi dan memiliki daging yang **padat**. Namun ikan tongkol juga sangat mudah mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan ikan antara lain kadar air yang cukup

tinggi yang menyebabkan mikroorganisme mudah untuk berkembang biak (Astawan, 2004). Menurut Suzuki (1981), kandungan kimia pada ikan tongkol terdiri dari kadar air 71.00% - 76,70%, kadar protein 21.60% - 26.30%, kadar abu 1.45% - 3.40%. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menghambat proses pembusukan dengan cara pengolahan dan pengawetan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengawetkan ikan adalah dengan cara pengasapan. Selama ini, pengasapan yang dilakukan masih menggunakan metode tradisional. Beberapa kelemahan pengasapan tradisional yaitu flavor dan konsentrasi konstituen asap tidak seragam, waktu dan suhu tidak sama sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pengasapan ikan dapat dilakukan dengan penggunaan asap cair sebagai bahan pengawet ikan yang lebih aman, memberikan citarasa yang khas, dan dapat memperpanjang masa simpan ikan.

Asap cair merupakan campuran larutan dari dispersi asap kayu dalam air yang dibuat dengan mengko<sup>8</sup>lensi asap hasil pirolisis kayu (Karseno, 2002). Asap cair telah digunakan secara komersial sebagai bahan pemberi aroma pada ikan dan daging karena adanya komponen flavor dari senyawa senyawa fenolik (Muratote, 2007). Asap cair mempunyai beberapa keunggulan, yaitu memiliki aktivitas antibakteri, penggunaan lebih mudah, dosis dapat diatur, tidak mengandung komponen yang berbahaya (Muratore, 2007).

Pada proses pengasapan cair, aroma asap yang akan dihasilkan didapat tanpa melalui proses pengasapan, melainkan melalui penambahan cairan bahan pengasap ke dalam produk yang dapat dilakukan dengan penuangan langsung, pengasapan, pengolesan atau penyemprotan. Setelah itu, dilakukan proses pengovenan dan menjadi produk akhir (Sul<sup>55</sup>owati, 2011).

Asap cair dapat diperoleh dari berbagai macam jenis bahan baku pertanian, salah satunya adalah batang bambu tabah yang berasal dari Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Asap cair batang bambu tabah mengandung komponen-komponen kimia, seperti total asam pada suhu 400°C sebesar 12,354%, total fenol asap cair pada suhu 400°C sebesar 22,06 mg/L, nilai rata-rata pH sebesar 3,20 – 3,70, dan nilai rata-rata kadar air sebesar 7,18% (Diatmika, 2019). Pemanfaatan bambu tabah belum maksimal digunakan. Penggunaannya hanya sebagai bahan pelengkap upacara adat istiadat dan bahan pangan berupa rebung (Kencana *et al*, 2012). Oleh sebab itu pemanfaatan asap cair yang berasal <sup>21</sup>i batang bambu tabah perlu dikaji lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama pengovenan ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah terhadap karakteristik produk ikan olahan yang dihasilkan dan untuk menentukan suhu dan lama pengovenan terhadap karakteristik organoleptik terbaik ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bamb<sup>20</sup>tabah.

## METODE

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa<sup>5</sup> Alat dan Ergonomika, Laboratorium Analisis Pangan, dan Laboratorium Pascapanen Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas <sup>35</sup>Jayana. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2019.

### Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu unit alat pirolisator asap cair yang terdiri dari reaktor pirolisis dan kondensor dengan kapasitas 3 kg, gergaji, botol, corong, tabung reaksi, kertas saring, baskom, thermometer, *coldbox*, oven listrik, timbangan analitik, erlenmeyer, desikator, labu kjeldal, *soxhlet*, cawan porselin, penjepit, muffle furnace, gelas uk<sup>10</sup> kompor listrik, pisau, telenan, mortal dan pastel, pH meter.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu batang bambu tabah, ikan tongkol, air kemasan, aquades, NaOH, NaCl, H<sub>2</sub><sup>17</sup>, tablet Kjeldahl, asam borat, dan phenolphthalein 1%.

### Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah <sup>48</sup>rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor yang terdiri dari 3 taraf perl<sup>61</sup>n. Faktor pertama adalah suhu pengovenan (S) yang terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu sul<sup>33</sup> 60°C (S<sub>1</sub>), suhu 80°C (S<sub>2</sub>), dan suhu 100°C (S<sub>3</sub>). Faktor kedua adalah lama pengovenan (W) yang terdiri dari 3 taraf perlakuan yaitu 2 jam (W<sub>1</sub>), 3 jam (W<sub>2</sub>), dan 4 jam (W<sub>3</sub>). Seluruh perlakuan diulang sebanyak <sup>54</sup> 2 kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam pada program SPSS. Jika perlakuan berpengaruh terhadap variabel yang diamati, dilanjutkan dengan uji Duncan (Sastrosupadi, 2000).

### Pelaksanaan Penelitian

#### Prosedur Pembuatan Asap Cair Batang Bambu Tabah

Bahan baku batang bambu tabah diperoleh dari Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Batang bambu tabah yang siap untuk dijadikan bahan baku adalah batang bambu yang sudah berumur minimal 2 tahun. Batang bambu tabah dipotong potong dengan panjang 5 cm, lalu dijemur dibawah sinar matahari selama kurang lebih 7 hari. Tujuan dari penjemuran ini adalah untuk menyeragamkan tingkat kekeringan bambu. Bahan baku yang dibutuhkan sebanyak 3 kg batang bambu tabah yang sudah dikeringkan dengan kadar air sebesar 7%.

Batang bambu tabah yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis yang dilengkapi dengan alat pemanas menggunakan kompor. Kemudian, tabung pirolisis ditutup dengan

rapat. Rangkaian alat kondensasi dipasang dan tabung pendingin dialiri dengan air dingin menggunakan pompa, sehingga terjadi sirkulasi perputaran air. Pada proses pemanasannya, menggunakan kompor gas untuk membakar tabung pirolisis. Batang bambu tabah yang berada didalam tabung akan mengalami proses pirolisis, dimana terjadinya perombakan senyawa penyusun bambu tabah menjadi fase gas. Asap cair yang dihasilkan pada tahap ini masih mengandung senyawa tar yang berbahaya bagi tubuh. Oleh sebab itu, harus dilakukan proses pemurnian melalui proses destilasi (Darmaji *et al.* 1999). Sebelumnya, asap cair yang dihasilkan pada proses ini, diendapkan terlebih <sup>13</sup>ulu selama 1 hari. Cairan yang telah diendapkan diambil dan dimasukkan ke dalam alat destilasi. Suhu destilasi yaitu 150°C, selanjutnya hasil destilasi ditampung. Proses destilasi dilakukan sebanyak dua kali untuk mendapatkan asap cair grade 1.

#### Prosedur Pengaplikasian Asap Cair Batang <sup>27</sup>mbu Tabah

Bahan baku yang digunakan adalah ikan tongkol segar dengan ukuran panjang ikan 13-15 cm dengan berat ±300g per ekornya sebanyak 18 ekor yang didapat dari Pasar Kedonganan. Bahan baku yang didapat dimasukkan ke dalam coolbox yang berisi es dan langsung dibawa ke laboratorium penelitian. Ikan dibersihkan dengan membuang insang dan isi perut ikan. Kemudian dilakukan pencucian pada ikan untuk menghilangkan sisa kotoran, lendir, dan darah yang masih melekat pada ikan. Ikan tongkol direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah dengan konsentrasi 6%, lama perendaman selama 30 menit (Sutanaya, 2018). Ikan tongkol harus terendam sampai keseluruhan permukaannya. Setelah proses perendaman, ditiriskan selama 15 menit. Tahapan selanjutnya adalah proses pengovenan ikan dengan menggunakan oven <sup>10</sup>rik dengan suhu pengovenan yang berbeda, yaitu 60°C, 80°C, <sup>13</sup> 100°C dan lama pengovenan yang berbeda yaitu selama 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Ikan tongkol disusun rapi diatas wadah oven dengan tujuan pemantangan yang merata pada keseluruhan permukaan ikan.

#### Parameter yang Diamati

Paramete <sup>62</sup>ng diamati dalam penelitian ini adalah kadar air <sup>de 32</sup>an metode pemanasan (Sudarmadji *et al.* 1997), kadar abu dengan metode pengabuan (Sudarmadji *et al.* 1997), kadar protein dengan metode semi mikro-Kjeldhal (Sudarmadji *et al.* 1997), nilai pH menggunakan pH-meter (AOAC, 1995), dan uji organoleptik pada produk ikan tongkol mengacu pada uji organoleptik ikan tongkol asap (SNI 01 – 2346 – 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

47

### Nilai pH


Nilai pH merupakan salah satu parameter yang penting pada suatu produk olahan, khususnya ikan olahan. Nilai pH yang diharapkan dari ikan tongkol ialah rendah (asam). Tujuannya untuk memperpanjang masa simpan ikan tongkol olahan. Adapun nilai rata-rata nilai pH ikan <sup>19</sup>gkol olahan dari berbagai kombinasi perlakuan <sup>disajikan pada</sup> Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel 1

Nilai rata-rata nilai pH ikan tongkol olahan pada berbagai perlakuan suhu dan lama pengovenan.

	<sup>24</sup> <sub>1</sub>	<i>W</i> <sub>2</sub>	<i>W</i> <sub>3</sub>	Rata-rata
<i>S</i> <sub>1</sub>	5.30 <sup>a</sup>	5.30 <sup>a</sup>	5.30 <sup>a</sup>	5.30
<i>S</i> <sub>2</sub>	5.40 <sup>b</sup>	5.40 <sup>b</sup>	5.40 <sup>b</sup>	5.40
<i>S</i> <sub>3</sub>	5.50 <sup>a</sup>	5.40 <sup>b</sup>	5.55 <sup>a</sup>	5.48
Rata-rata	5.40	5.37	5.43	5.40

Ket : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata ( $P>0,05$ ).



Gambar 1. Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Terhadap Nilai pH Ikan Tongkol Olahan.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengovenan, perlakuan waktu <sup>17</sup>ovenan dan kombinasi kedua perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap nilai pH ikan tongkol olahan yang dihasilkan. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai pH ikan tongkol olahan yang dihasilkan berkisar antara 5,30 sampai 5,55. Nilai pH terendah yaitu 5,30 terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 60°C dengan waktu pengovenan selama 2 jam (*S*<sub>1</sub>*W*<sub>1</sub>) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu pengovenan 60°C dengan waktu pengovenan selama 3 jam (*S*<sub>1</sub>*W*<sub>2</sub>), dan suhu pengovenan 60°C dengan waktu pengovenan selama 4 jam (*S*<sub>1</sub>*W*<sub>3</sub>). Nilai pH tertinggi yaitu 5,55 terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 100°C dengan waktu pengovenan selama 4 jam (*S*<sub>3</sub>*W*<sub>3</sub>) dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu pengovenan 100°C dengan waktu pengovenan selama 2 jam

( $S_3W_1$ ). Nilai rata-rata pH kombinasi keseluruhan yaitu 5,40.

Asap cair batang bambu tabah mampu menurunkan nilai pH dari ikan tongkol. Semakin tinggi konsentrasi asap cair yang ditambahkan, maka akan semakin rendah nilai pH nya. Penurunan nilai pH disebabkan oleh penyerapan senyawa asam seperti asetat dan asam formiat pada asap cair, sementara pH asap cair batang bambu tabah yang dihasilkan adalah sebesar 3,6. Nilai pH yang rendah dapat mempengaruhi kualitas ikan olahan yang dihasilkan. Hasil penelitian dari Suprayitno *et al.* (2000), menunjukkan bahwa asap cair dari kayu akasia mempunyai asam organik tinggi sehingga menjadikan penurunan pH pada ikan belut asap. Sementara Martinez *et al.* (2007), menyebutkan penguapan yang terjadi pada ikan asap menyebabkan penurunan pH karena penyerapan senyawa asam yang terkandung pada asap dan reaksi antara fenol, polifenol dengan senyawa karbonil pada protein.

### Kadar Air

Kadar air bahan pangan merupakan jumlah air yang terkandung pada bahan tersebut, serta sangat berpengaruh pada mutu dan keawetan pangan. Air merupakan komponen terbanyak yang terdapat di dalam daging ikan (Hadiwiyoto, 1993). Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Afrianto dan Liviawaty, 1989). Analisis kadar air bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pengovenan dan lama pengovenan ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah terhadap perubahan kadar air pada produk ikan tongkol olahan. Nilai rata-rata kadar air ikan tongkol olahan dari berbagai kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2.

**Tabel 2**


Nilai rata-rata kadar air ikan tongkol olahan pada berbagai perlakuan suhu dan lama pengovenan.

	$W_1$	$W_2$	$W_3$	Rata-rata
$S_1$	69.03 <sup>a</sup>	67.14 <sup>b</sup>	65.36 <sup>c</sup>	67.18
$S_2$	66.71 <sup>b</sup>	63.58 <sup>d</sup>	60.54 <sup>e</sup>	63.61
$S_3$	64.54 <sup>cd</sup>	60.33 <sup>e</sup>	58.06 <sup>f</sup>	60.98
Rata-rata	66.76	63.68	61.32	63.92

Ket : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada  $\text{S}_1$  ris dan kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata ( $P > 0,05$ ).

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengovenan, perlakuan waktu pengovenan dan kombinasi kedua perlakuan berpengaruh nyata ( $P < 0,05$ ) terhadap kadar air ikan

tongkol olahan yang dihasilkan. Tabel 2 menunjukkan kadar air ikan tongkol olahan yang dihasilkan berkisar antara 58,06% sampai 69,03%. Nilai kadar air terendah yaitu 58,71% terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 100°C dengan waktu pengovenan selama 4 jam ( $S_3W_3$ ). Nilai kadar air tertinggi yaitu 69,03% terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 60°C dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $S_1W_1$ ). Nilai rata-rata kadar air kombinasi keseluruhan yaitu 63,92%.



**Gambar 2.** Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Terhadap Kadar Air Ikan Tongkol Olahan.

Penggunaan asap cair dapat menyebabkan terjadinya kehilangan air pada produk (Leroi dan Joffraud 2000). Gomez-Guillen *et al.* (2003) menyatakan bahwa tingkat keasaman asap cair dapat menyebabkan ketidaklarutan protein daging, sehingga berakibat pada keluarnya air dari daging ikan. Semakin tingginya konsentrasi asap cair yang ditambahkan maka jumlah asap cair yang meresap kedalam daging ikan akan meningkat. Meresapnya asap cair kedalam daging ikan menyebabkan air bebas di dalam daging ikan akan terdesak keluar sehingga kadar air pada ikan menjadi berkurang.

Pemasakan dalam oven jelas memperkuat bahwa jumlah kehilangan air meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu pengovenan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Riansyah *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu dan lamanya waktu pengeringan yang diberikan, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kecepatan perpindahan air ikan asin sepat siam.

Standar kadar air ikan tongkol asap yang ditetapkan oleh SNI 2725.2.2009 adalah maksimal 60%. Hasil nilai rata-rata kadar air yang diperoleh pada setiap perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan yang memenuhi standar kadar air ikan tongkol asap menurut SNI yaitu perlakuan suhu pengovenan 100°C dengan waktu pengovenan selama 4 jam ( $S_3W_3$ ) yaitu 58,06%.

### Kadar Abu


Kadar abu merupakan parameter nilai gizi suatu bahan produk yang dihasilkan oleh komponen zat organik yang terdapat di dalam ikan. Menurut Sudarmadji *et al.* (2003), kadar abu berhubungan dengan mineral suatu bahan. Mineral yang terdapat dalam bahan dapat berupa dua macam garam, yaitu garam organik dan anorganik. Komponen mineral dalam bahan dapat ditentukan jumlahnya dengan cara menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral tersebut. Nilai rata-rata kadar abu ikan tongkol olahan dari berbagai komponen nasi perlakuan disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 3.

**Tabel 3**

Nilai rata-rata kadar abu ikan tongkol olahan pada berbagai perlakuan suhu dan lama pengovenan.

	<i>W</i> <sub>1</sub>	<i>W</i> <sub>2</sub>	<i>W</i> <sub>3</sub>	Rata-rata
<i>S</i> <sub>1</sub>	1.14 <sup>h</sup>	1.26 <sup>g</sup>	1.39 <sup>e</sup>	1.26
<i>S</i> <sub>2</sub>	1.26 <sup>g</sup>	1.36 <sup>f</sup>	1.45 <sup>d</sup>	1.35
<i>S</i> <sub>3</sub>	1.51 <sup>c</sup>	1.59 <sup>b</sup>	1.69 <sup>a</sup>	1.59
Rata-rata	1.30	1.40	1.51	1.40

Ket : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata ( $P>0,05$ ).



**Gambar 3.** Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Terhadap Kadar Abu Ikan Tongkol Olahan.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu pengovenan, perlakuan pengovenan dan kombinasi kedua perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap kadar abu ikan tongkol olahan yang dihasilkan. Tabel 3 menunjukkan bahwa kadar abu ikan tongkol olahan yang dihasilkan berkisar antara 1,14% sampai 1,69%. Nilai kadar abu terendah yaitu 1,14% terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 60°C dengan waktu pengovenan selama 2 jam (*S*<sub>1</sub>*W*<sub>1</sub>). Nilai kadar abu tertinggi yaitu 1,69% terdapat pada perlakuan suhu pengovenan 100°C dengan waktu pengovenan selama 4 jam (*S*<sub>3</sub>*W*<sub>3</sub>). Nilai rata-rata kadar abu kombinasi keseluruhan yaitu 1,40%. Penelitian Swastawati, F. (2007), kadar abu ikan kembung asap

menggunakan asap cair sekam padi adalah 2,38%, sementara penelitian Agbabiaka *et al.* (2012), ikan manyung asap (*Arius thallasinus*) yang di asap selama 4 jam memiliki kadar abu sebesar 2,34%. Kenaikan nilai kadar abu pada ikan akan terus berlangsung dengan semakin besarnya suhu dan waktu pengovenan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan waktu pengovenan mengakibatkan nilai kadar abu pada ikan akan semakin banyak, berbanding terbalik dengan kadar air yang semakin menurun. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Asrawaty, (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan kadar abu ini terjadi karena semakin lama waktu dan semakin tinggi suhu pengeringan maka akan semakin banyak air yang teruapkan dari bahan yang dikeringkan. Dengan pernyataan Sudarmadji *et al.* (1997), kadar abu tergantung pada jenis bahan, cara pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan saat pengeringan.

### Kadar Protein


Protein daging ikan tongkol olahan merupakan komponen terbesar kedua dalam jumlahnya setelah protein ikan merupakan komponen terbesar dalam jumlahnya setelah air dan merupakan bagian yang sangat berguna bagi manusia. Nilai rata-rata kadar protein ikan tongkol olahan dari berbagai komponen nasi perlakuan disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 4.

**Tabel 4**

Nilai rata-rata kadar protein ikan tongkol olahan pada berbagai perlakuan suhu dan lama pengovenan.

	<i>W</i> <sub>1</sub>	<i>W</i> <sub>2</sub>	<i>W</i> <sub>3</sub>	Rata-rata
<i>S</i> <sub>1</sub>	5.95 <sup>h</sup>	8.88 <sup>f</sup>	11.44 <sup>d</sup>	8.76
<i>S</i> <sub>2</sub>	7.85 <sup>g</sup>	10.36 <sup>e</sup>	13.74 <sup>c</sup>	10.65
<i>S</i> <sub>3</sub>	10.47 <sup>e</sup>	14.39 <sup>b</sup>	18.29 <sup>a</sup>	14.38
Rata-rata	8.09	11.21	14.49	11.26

Ket : Huruf yang sama dibelakang nilai rata-rata pada baris dan kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata ( $P>0,05$ ).



**Gambar 4.** Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Terhadap Kadar Protein Ikan Tongkol Olahan.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan suhu pemanasan, perlaku<sup>23</sup> waktu pemanasan dan kombinasi kedua perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap kadar protein ikan tongkol olahan yang dihasilkan. Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar protein ikan tongkol olahan yang dihasilkan berkisar antara 5,95% sampai 18,29%. Nilai kadar protein terendah yaitu 5,95% terdapat pada perlakuan suhu pemanasan 60°C dengan waktu pemanasan selama 2 jam ( $S_1W_1$ ). Nilai kadar protein tertinggi yaitu 18,29% terdapat pada perlakuan suhu pemanasan 100°C dengan waktu pemanasan selama 4 jam ( $S_3W_3$ ). Nilai rata-rata kadar protein kombinasi keseluruhan yaitu 11,26%. Berdasarkan penelitian Ekpenyong *et al.*, (2012) menyebutkan bahwa kandungan protein pada African catfish (*Clarias gariepinus*) asap menggunakan smoking kiln sebesar 10,95%.

Kadar protein sangat berhubungan erat dengan kadar air suatu produk. Meningkatnya nilai protein diikuti dengan menurunnya kadar air produk. Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Sebraneck (2009) yang menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya nilai protein yang terukur dapat dipengaruhi oleh besarnya kandungan air yang hilang dari bahan. Nilai protein akan semakin besar jika jumlah air yang hilang semakin besar. Winarno dalam Marabessy (2007), dengan berkurangnya kadar air, maka bahan pangan akan meningkatkan senyawa-senyawa seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Sejalan dengan pernyataan<sup>12</sup> Adawayah (2007) yang menyatakan bahwa kadar air yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kandungan protein di dalam bahan mengalami peningkatan. Penggunaan panas dalam pengolahan bahan pangan dapat menurunkan persentase kadar air yang mengakibatkan persentase kadar protein meningkat. Hubungan<sup>5</sup> konsentrasi asap cair terhadap nilai protein ialah, semakin tinggi konsentrasi asap cair yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kadar protein. Hal tersebut disebabkan karena turunnya kadar air pada produk, sehingga akan mempengaruhi dalam persentasi jumlah protein.

### Evaluasi Sensori

Evaluasi sensori ikan tongkol olahan dilakukan dengan uji skoring dan uji hedonik. Uji skoring dilakukan terhadap warna, tekstur, rasa, dan aroma, sedangkan uji hedon<sup>53</sup> dilakukan terhadap penerimaan keseluruhan. Nilai rata-rata uji skoring dan hedonik dapat dilihat pada Tabel 5.

Produk yang disajikan kehadapan panelis merupakan ikan tongkol olahan hasil penelitian. Warna, aroma, tekstur, dan rasa dari ikan tongkol olahan terbentuk dari reaksi gugus karbonil yang terkandung dalam asap cair bereaksi dengan protein dan lemak tubuh

ikan. Komponen karbonil utama dalam asap cair yang berperan penting adalah senyawa fenol yang juga berperan sebagai antioksidan. Hal ini di dukung oleh Kostyra and Pikielna (2006) yang menyatakan bahwa senyawa karbonil dan fenol maupun turunannya berkontribusi dalam menentukan warna, aroma, dan rasa yang khas pada produk yang diasap. Menurut Simko (2005), beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk ikan asap diantaranya yaitu yang berhubungan dengan proses pengasapan, seperti jenis asap cair yang digunakan, komposisi asap cair, suhu, dan kelembaban.

**Tabel 5**

Nilai rata-rata uji skoring dan hedonik warna, tekstur, aroma, rasa, penerimaan keseluruhan ikan tongkol olahan.

Sampel	Nilai Rata-Rata Evaluasi Sensori				
	Warna	Aroma	Tekstur	Rasa	P. Kes
$S_1W_1$	2,61 <sup>a</sup>	3,11 <sup>c</sup>	2,33 <sup>a</sup>	2,78 <sup>e</sup>	2,28 <sup>f</sup>
$S_1W_2$	3,44 <sup>a</sup>	4,33 <sup>ab</sup>	2,78 <sup>a</sup>	3,28 <sup>d</sup>	2,83 <sup>e</sup>
$S_1W_3$	3,06 <sup>a</sup>	4,11 <sup>ab</sup>	3,22 <sup>a</sup>	3,39 <sup>cd</sup>	3,17 <sup>de</sup>
$S_2W_1$	3,72 <sup>a</sup>	3,94 <sup>b</sup>	3,89 <sup>a</sup>	3,83 <sup>bc</sup>	3,39 <sup>cd</sup>
$S_2W_2$	4,06 <sup>a</sup>	4,17 <sup>ab</sup>	4,06 <sup>a</sup>	4,44 <sup>a</sup>	4,22 <sup>b</sup>
$S_2W_3$	4,11 <sup>a</sup>	4,56 <sup>a</sup>	4,28 <sup>a</sup>	4,28 <sup>ab</sup>	3,72 <sup>c</sup>
$S_3W_1$	4,17 <sup>a</sup>	4,06 <sup>ab</sup>	4,39 <sup>a</sup>	4,72 <sup>a</sup>	4,56 <sup>ab</sup>
$S_3W_2$	4,33 <sup>a</sup>	4,22 <sup>ab</sup>	4,50 <sup>a</sup>	4,33 <sup>a</sup>	4,78 <sup>a</sup>
$S_3W_3$	3,94 <sup>a</sup>	4,28 <sup>ab</sup>	4,72 <sup>a</sup>	4,50 <sup>a</sup>	4,39 <sup>ab</sup>

Ket : Huruf yang sama dibelakangi nilai rata-rata  
<sup>31</sup>la kolom yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata ( $P>0,05$ ).

### Warna

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengovenan pada ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ), namun faktor suhu dan waktu pengovenan tidak berinteraksi ( $P>0,05$ ) terhadap nilai uji skoring warna ikan tongkol olahan. Hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi warna ikan tongkol olahan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 100°C ( $S_3$ ) dengan waktu pengovenan selama 3 jam ( $W_2$ ) yaitu sebesar 4,33. Sedangkan nilai terendah warna ikan tongkol olahan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 60°C ( $S_1$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 2,61. Warna coklat dihasilkan dari reaksi fenol dengan oksigen di udara (Cardinal *et al.* 2006). Hal tersebut di dukung juga oleh Hadiwiyoto *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa senyawa fenol juga berkontribusi pada warna coklat produk ikan asap.

### Aroma

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengovenan pada ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair<sup>52</sup> batang bambu tabah dan interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ )

terhadap nilai uji skoring aroma ikan tongkol olahan. Hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi uji skoring aroma ikan tongkol olahan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 80°C ( $S_2$ ) dengan waktu pengovenan selama 4 jam ( $W_3$ ) yaitu sebesar 4,56. Sedangkan nilai terendah uji skoring aroma ikan tongkol olahan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 60°C ( $S_1$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 3,11. Aroma yang dihasilkan disebabkan oleh reaksi kimia antara ikan dan komponen kimia dalam asap cair. Semakin tinggi konsentrasi asap cair yang diberikan, maka aroma asap akan semakin meningkat dan ikan yang <sup>34</sup> u mengalami proses pengasapan memiliki aroma asap yang lembut sampai cukup tajam atau tajam, tidak tengik, tanpa bau busuk (Martinez *et al.* 2007). Hal itu didukung oleh Hadiwiyoto *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa golongan fenol pada asap cair mampu memberikan bau asap.

#### Tekstur

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengovenan pada ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap nilai uji skoring tekstur dari ikan tongkol olahan, namun suhu dan waktu pengovenan tidak berinteraksi ( $P>0,05$ ) terhadap nilai uji skoring tekstur ikan tongkol olahan. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi uji skoring tekstur diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 100°C ( $S_3$ ) dengan waktu pengovenan selama 4 jam ( $W_3$ ) yaitu sebesar 4,72. Sedangkan nilai terendah uji skoring tekstur diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 60°C ( $S_1$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 2,33. Tekstur yang dihasilkan terhadap ikan tongkol olahan dipengaruhi oleh suhu dan waktu pengovenan yang berbeda, dimana semakin besar suhu dan semakin lama waktu pengovenan akan menghasilkan tekstur yang semakin keras pada ikan tongkol olahan.

Tekstur yang dihasilkan dari setiap perlakuan memiliki nilai yang berbeda beda. Penyebabnya karena kandungan air dalam daging ikan, suhu dan lama pengovenan, sehingga tekstur pada ikan tongkol olahan terasa cukup kering atau kurang kering, padat dan kompak pada parameter tekstur. Menurut Purnomo (1995), menjelaskan bahwa kadar air dan aktivitas air dalam bahan pangan sangat besar peranannya terutama dalam menentukan tekstur bahan pangan. Hal ini didukung oleh Simko (2005) menyatakan selama pengasapan berlangsung, terjadi fluktuasi suhu yang tinggi sehingga menyebabkan kadar airnya berkurang dan menghasilkan tekstur menjadi lebih keras, sebaliknya bila kadar air tinggi menyebabkan tekstur menjadi lebih lunak. Sesuai dengan penelitian Dadik (2006) menyatakan bahwa

semakin rendah kadar air yang terdapat dalam dendeng seiring meningkatnya suhu maka produk dendeng tersebut semakin renyah.

#### Rasa

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa faktor suhu pada ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah dan interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap nilai uji skoring rasa ikan tongkol olahan. Hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi uji skoring rasa diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 100°C ( $S_3$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 4,72. Sedangkan nilai terendah uji skoring rasa diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 60°C ( $S_1$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 2,78. Rasa khas yang dihasilkan pada produk menunjukkan rasa gurih serta <sup>45</sup>is ikan asap. Winarno (2004) menyatakan bahwa rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu senyawa kimia dan konsentrasi asap cair. Menurut Yulstiani (2008), citarasa spesifik yang dimiliki produk hasil pengasapan dihasilkan dari senyawa fenol yang diserap permukaan produk.

#### Penerimaan Keseluruhan

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa suhu dan waktu pengovenan pada ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah dan interaksi antar perlakuan berpengaruh nyata ( $P<0,05$ ) terhadap nilai uji hedonik penerimaan keseluruhan produk ikan tongkol. Hasil Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tertinggi uji hedonik penerimaan keseluruhan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 100°C ( $S_3$ ) dengan waktu pengovenan selama 3 jam ( $W_2$ ) yaitu sebesar 4,78 (sangat suka). Sedangkan nilai terendah uji hedonik penerimaan keseluruhan diperoleh pada perlakuan suhu pengovenan 60°C ( $S_1$ ) dengan waktu pengovenan selama 2 jam ( $W_1$ ) yaitu sebesar 2,28 (tidak suka). Nilai uji hedonik penerimaan keseluruhan baik dari segi warna, tekstur, rasa, dan aroma menunjukkan bahwa ikan tongkol yang direndam dalam larutan asap cair batang bambu tabah menghasilkan produk akhir ikan tongkol olahan yang dapat diterima oleh panelis.

30

## KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diamalkan kesimpulan sebagai bahwa suhu pengovenan berpengaruh nyata <sup>58</sup>hadap pH, kadar air, kadar abu, protein, warna, aroma, tekstur, rasa, dan penerimaan secara keseluruhan. Semakin tinggi suhu pengovenan mengakibatkan peningkatan terhadap kadar abu, kadar protein, warna, tekstur,

rasa, namun mengakibatkan penurunan terhadap pH dan kadar air.

Waktu pengovenan berpengaruh nyata terhadap pH, kadar air, kadar abu, protein, warna, aroma, tekstur, dan penerimaan keseluruhan dan tidak berpengaruh terhadap rasa. Semakin tinggi waktu pengovenan mengakibatkan peningkatan terhadap kadar abu, kadar protein, warna, tekstur, rasa, namun mengakibatkan penurunan terhadap pH dan kadar air.

Kombinasi perlakuan suhu dan waktu pengovenan berpengaruh nyata terhadap pH, kadar air, kadar abu, protein, aroma, rasa, penerimaan keseluruhan dan tidak berpengaruh terhadap warna, tekstur. Suhu pengovenan 100°C dan waktu pengovenan selama 4 jam menghasilkan ikan tongkol olahan terbaik, yaitu pH 5,55, kadar air 58,06%, kadar abu 1,69%, kadar protein 18,29%, warna 3,94, aroma 4,28, tekstur 4,72, rasa 4,5, dan penerimaan keseluruhan 4,39.

39

### Saran

Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran nilai TVB (*Total Volatile Base*), nilai TPC (*Total Plate Count*) dan mengenai masa simpan ikan tongkol hasil penelitian.

16

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawayah, R. 2007. Pengolahan dan Pengawetan Ikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Afrianto, E & Liviawaty, E. 1989. Pengawetan dan Pengolahan Ikan. Yogyakarta : Kanisius.
- Agbabiaka, L. A., Amadi A. S., Madubuko, C. U. Nwanko, F.C., and Ojukannaiye A. S. 2012. Assessment of nutrients and sensory qualities of brine pre – treated catfish smoked with two different woods. African Journal pf Food Science Vol. 6 (7). 245-248. 29
- Anonimous. 1995. Method of Analysis. Association of Official Analytical Chemistry. Washington D.C. 29
- Asrawayt. 2011. Pengaruh suhu dan lama pengeringan terhadap mutu tepung pandan. Jurnal KIAT Edisi Juni. Universitas Alkhairaat. Palu. 11
- Astawan, Made. (2004). Ikan Yang Sedap Dan Bergizi. Solo: Tiga Serangkai. 25
- Badan Standardisasi Nasional. 2006. *Uji Organoleptik Ikan Tongkol Asap*. SNI 01.2346.2006. Jakarta : BSN.
- Badan Standardisasi Nasional. 2009. *Spesifikasi Ikan Asap*. SNI 2725. 2: 2009. Jakarta : BSN.
- Cardinal, M., Cornet, J., Serot, T., Baron, R. 2006. Effects of the smoking process on odour characteristics of smoked herring (*Clupea harengus*) and relationship with phenolic compound content. Food Chemistry: 137-146.
- Dadik. 2006. Pengaruh Waktu Curing (Perendaman dalam Larutan Bumbu) Terhadap Mutu Dendeng Fillet Ikan Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*) Selama Penyimpanan. Skripsi. Bogor: Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 1
- Darmadji, P., Supriyadi, dan Hidayat, C. 1999. Produksi asap rempah cair dan limbah padat rempah dengan cara pirolisa. Agritech. 19 (1): 11–15.
- Diatmika, I Gusti Ngurah Agung Yogi Angga. 2019. Karakteristik Asap Cair Batang Bambu Tabah (*Gigantochloa nigrociliata* Buse-Kurs) Dengan Proses Pirolisis Pada Suhu Yang Berbeda. Jimbaran Bali Uda. 57 na.
- Ekpenyoung, E., C. O. Ibok. 2012. Effect of smoking, salting and frozen-<sup>36</sup>age on the nutrient composition of the african catfish (*Clarias gariepinus*). Journal of Food, Agriculture and Environment Vol. 10 (1): 64-66.
- Gómez-Guillén, M. C., Montero, P., Hurtado, O., & Borderias, A. J. (2003). Biological characteristics affect the quality of farmed Atlantic salmon and smoked muscle. *Journal of Food Science*, 65(1), 53-60.
- Hadiwiyoto. 1993. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Liberty. Yogyakarta.
- Hadiwiyoto, Suwedo., Sri Naruki., Sri Satyanti., Hastini Rahayu., dan Diana Riptakasari. 2000. Perubahan kelarutan protein, kandungan lisin (*Available*), metionin, dan histidin bandeng presto selama penyimpanan dan pemasakan ulang. Agritech Vol. 19. No. 2. Universitas Gajahmada. Yogyakarta:78-82.
- Karseno, K., Darmadji, P., & Rahayu, K. (2002). Daya hambat asap cair kayu karet terhadap bakteri pengkontaminan lateks dan ribbed smoke sheet. Agritech, 21(1), 10-15.
- Kencana P. K. D., Widia, W. dan Antara, N. S. 2012. Praktek Baik Budi Daya Bambu Rebung Tabah (*Gigantochloa Nigrociliata* Buse-Kurz), pp. 1-69.
- Kostyra, Eliza and Pikielna, Nina Barylko. 2006. Volatiles composition and flavour profile identity of smoke flavourings. Food Quality and Preference 17. Pp 85-95.
- Leroi, F., & Joffraud, J. J. (2000). Salt and smoke simultaneously affect chemical and sensory quality of cold-smoked salmon during 5 °C storage predicted using factorial design. *Journal of food protection*, 63(9), 1222-1227.
- Marabessy, I. 2007. Produksi Asap Cair dari Limbah Pertanian dan Penggunaannya dalam Pembuatan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) Asap. [Tesis]. IPB. Bogor.

- Martinez, O., J. Salmeron, M.D. Guillen and C. Casas. (2007). Textural and physicochemical changes in salmon (*Salmo salar*) treated with commercial liquid smoke flavourings. *Food Chemistry*. 100. 498-503.
- 7** Muratore, G., Mazzaglia, A., Lanza, C., & Licciardello, F. (2007). Effect of process variables on the quality of swordfish fillets flavored with smoke condensate. *Journal of Food Processing and Preservation*, 31(2), 167-177.
- 37** Purnomo, H. 1995. Aktivitas Air dan Peranannya dalam Pengawet Pangan. UI-Press, Jakarta.
- 3** Riansyah, Agus Supriadi\*, Rodiana Nopianti., 2013. Pengaruh Perbedaan Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Karakteristik Ikan Asin Sepat Siam (*Trichogaster Pectoralis*) dengan Menggunakan Oven. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sriwijaya Indralaya Ogan Hilir.
- Sastrosupadi. 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius. Malang. 276p.
- Sebranek, J. 2009. *Basic Curing Ingredients*. Di dalam: Tarte R, editor. *Ingredients in Meat Product*. Properties, Functionality and Applications. New York: Springer Science. Page 1-24.
- 14** Simko P. 2005. Factors affecting elimination of polycyclic aromatic hydrocarbons from smoked meat foods and liquid smoke flavourings: a review of molecular nutrition. *Food Research* 49:637-647.
- 6** Sudarmadji, S., Haryono, B., Suhardi. 1997. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty Yogyakarta.
- 28** Sudarmadji, S., Haryono, B., dan Suhardi. 2003. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Liberty Yogyakarta. 171 hlm.
- Sulistijowati R., Djunaedi O., Nurahajati J., Afrianto E., Udin Z., 2011. Mekanisme Pengasapan., UNPAD PRESS., pdf., 13/06/2019/2:42pm., <http://44pository.iung.ac.id/get/karyailmiah/240/mekanisme-pengasapan-ikan.pdf>.
- Suprayitno, Eddy., T.J. Moejiharto, dan Wahyu Prasetya. 2000. Kualitas ikan sidat (*Anguilla bicolor*) asap dengan presentase garam dan kayu penghasil asap yang berbeda. *Jurnal Makanan Tradisional Indonesia*: 41-44.
- Sutanaya, Nyoman Try Atmajaya. 2018. *Aplikasi Penggunaan Asap Cair Terhadap Daya Awet Fillet Ikan Tuna*. Jimbaran Bali Udayana.
- 5** Suzuki, T. 1981. Fish and Krill Protein. *Processing Technology* A 51 ed Science, London.
- Swastawati, F. 2007. Pengasapan Ikan Menggunakan Liquid Smoke. Universitas Diponegoro. Semarang. 75 hlm.
- 32** Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

# Pengaruh Suhu dan Lama Pengovenan Ikan Tongkol

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bbp4b.litbang.kkp.go.id">bbp4b.litbang.kkp.go.id</a>	1 %
2	Submitted to Padjadjaran University	1 %
3	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a>	1 %
4	<a href="http://hdl.handle.net">hdl.handle.net</a>	1 %
5	Submitted to Unika Soegijapranata	1 %
6	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a>	1 %
7	<a href="http://di3a.unict.it">di3a.unict.it</a>	1 %
8	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a>	1 %
9	<a href="http://ntnu.diva-portal.org">ntnu.diva-portal.org</a>	1 %

10	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
12	duniamaстerantugas.blogspot.com Internet Source	1 %
13	id.scribd.com Internet Source	1 %
14	ejurnal.poltekkes-smg.ac.id Internet Source	<1 %
15	unmasmataram.ac.id Internet Source	<1 %
16	majupangaribuan.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
19	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	www.unud.ac.id Internet Source	<1 %

22	de.scribd.com Internet Source	<1 %
23	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
25	Christina Litaay, Sugeng Hari Wisudo, Hairati Arfah. "Penanganan Ikan Cakalang oleh Nelayan Pole and Line", Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2020 Publication	<1 %
26	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
27	Agustina E Manggaprouw, Roike Iwan Montolalu, I Ketut Suwetja. "Kajian Mutu Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) Segar di Pasar Bahu Manado", MEDIA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN, 2019 Publication	<1 %
28	jurnal.yudharta.ac.id Internet Source	<1 %
29	Mimi Nurminah, Terip Karo-Karo, Egi Aninta Sembiring. " The Physicochemical	<1 %

Characteristics of Dry Gelugur Slices ( ) ", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019

Publication

- 
- 30 [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) <1 %  
Internet Source
- 31 Ipat Kasyifatul Mufarihat, Sakinah Haryati, Aris Munandar. "Characteristic of "Bontot" Combined of Hawaiian Ladyfish (*Elops hawaiiensis*) Meat and Tarpon Fish (*Megalops cyprinoides*)", Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2019 <1 %  
Publication
- 32 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman <1 %  
Student Paper
- 33 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang <1 %  
Student Paper
- 34 Gordianus P Lombongadil, Albert Royke Reo, Hens Onibala. "STUDI MUTU PRODUK IKAN JAPUH (*Dussumieria acuta* C.V.) ASAP KERING INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA TUMPAAN BARU, KECAMATAN TUMPAAN", MEDIA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN, 2013 <1 %  
Publication
- 35 [repositori.umsu.ac.id](http://repositori.umsu.ac.id) <1 %  
Internet Source

- 
- 36 Submitted to Universitas Brawijaya <1 %  
Student Paper
- 37 Merri D. Rotinsulu, Tilje A. Ransaleleh, F. S. Ratulangi, E. S. Tangkere. "Kualitas Dendeng Babi Yang Menggunakan Gliserol+NaCl Selama Penyimpanan Pada Suhu Kamar", Jurnal MIPA, 2019 <1 %  
Publication
- 38 repository.ipb.ac.id <1 %  
Internet Source
- 39 id.123dok.com <1 %  
Internet Source
- 40 Submitted to Universitas Jember <1 %  
Student Paper
- 41 sinta3.ristekdikti.go.id <1 %  
Internet Source
- 42 A C Iwansyah, R Kumalasari, D A Darmajana, L Ratnawati. "Antioxidant properties and toxicity of selected bamboo shoots "iwung" extract: a comparative study", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019 <1 %  
Publication
- 43 Deliaspriake Buntu Kaiang, Lita ADY Montolalu, Roike Iwan Montolalu. "KAJIAN MUTU IKAN TONGKOL (Euthynnus Affinis) ASAP UTUH <1 %

**YANG DIKEMAS VAKUM DAN NON VAKUM  
SELAMA 2 HARI PENYIMPANAN PADA SUHU  
KAMAR", MEDIA TEKNOLOGI HASIL  
PERIKANAN, 2016**

Publication

---

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 44 | ebookinga.com  | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 45 | journal.ipb.ac.id  | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 46 | Adel Tuyu, Hens Onibala, Daisy Monica Makapedua. "Studi Lama Pengeringan Ikan Selar (Selaroides sp) Asin Dihubungkan Dengan Kadar Air Dan Nilai Organoleptik", MEDIA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN, 2014 | <1 % |
|    | Publication  |      |
| 47 | Submitted to Syiah Kuala University  | <1 % |
|    | Student Paper  |      |
| 48 | repository.usu.ac.id   | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 49 | bulelengkab.go.id  | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 50 | ejournal.upi.edu   | <1 % |
|    | Internet Source  |      |
| 51 | www.omicsonline.com  | <1 % |
|    | Internet Source  |      |

52

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

53

Anita Padang, Rochman Subiyanto, Marwa Marwa, Fira Aditya. "Pengaruh pemberian pakan ragi metode tetes dengan dosis yang berbeda terhadap kepadatan *Brachionus plicatilis*", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2017

Publication

54

eprints.upnyk.ac.id

Internet Source

<1 %

55

perpuspim.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Student Paper

<1 %

57

Anvari, Mohammad, Masoud Rezaei, and Sang Moo Kim. "Effects of Previous Gutting on Biochemical Changes and Profile of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Cold-Smoked Kutum (*Rutilus frisii kutum*) Stored at Room Temperature (25°C ± 2°C) : Previous Gutting of Cold-Smoked Kutum", Journal of Food Biochemistry, 2012.

Publication

<1 %

58

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

59

Submitted to Universitas Trilogi

Student Paper

<1 %

60

Submitted to Politeknik Negeri Bandung

Student Paper

<1 %

61

Arjuman Leko, Vita N Lawalata, Sandriana J Nendissa. "Kajian Penambahan Konsentrasi Susu Skim Terhadap Mutu Minuman Yogurt dari Limbah Air Cucian Beras Lokal", AGRITEKNO, Jurnal Teknologi Pertanian, 2018

Publication

<1 %

62

Zasendy Rehena, Lydia Maria Ivakdalam. "Pengaruh Substitusi Rumput Laut terhadap Kandungan Serat Cookies Sagu", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2019

Publication

<1 %

63

Submitted to Universitas Mataram

Student Paper

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off